

# ベクロメタゾン点鼻液 50 $\mu$ g [CEO]を使用する患者さんへ

## ●取り扱いにご注意ください。

### ① 針・ピン刺は厳禁です。



薬剤の噴霧が不十分な場合でも、針やピンなどで噴霧口を突かないでください。

噴霧口が塞がり、正常に噴霧できなくなります(下図参照)。

もう一度十分に振り混ぜ、指でささえて垂直の状態では薬液が噴出するまで(3~5回)、しっかり押ししてください。



噴霧口先端の断面図



### ② 分解は厳禁です。

品質及び機能保持のため、絶対にポンプとボトルをはずさないでください。

### ③ 噴霧器は直射日光を避けてなるべく涼しい所(30℃以下)に保管してください。

また、幼・小児の手の届かない所に保管してください。

# ベフロメタゾン点鼻液 50 $\mu$ g [CEO] の使用方法

## ● 新しい噴霧器を使用される前に

- ①②本剤は懸濁液ですので、初めて使用される場合は、キャップを外し、上下に約5回、十分に**振り混ぜてください**。  
(ただし、激しく振りすぎないように。)



- ③噴霧器を指でささえて垂直の状態ですら3~5回しっかり押します。薬液の噴出を確認してください。薬液が霧状に噴出するようになりましたら、「使用方法」に従って使用してください。



針やピンなどで噴霧口を突かないでください。

詳しくは反対面をご覧ください。



・2回目以降、この操作は不要です。 ・よく振り混ぜ、一気に強く押し切ってください。

## ● 使用方法(1本あたりの噴霧回数:約120回)



- ①鼻腔の通りをよくするため、噴霧前に軽く鼻をかみます。



- ②十分に**振り混ぜます**。(ただし、激しく振りすぎないように。)



- ③顔をうつむき加減にして、鼻孔内に噴霧器をまっすぐに立てて入れ、息を軽く吸いながら両側の鼻孔に1回ずつ噴霧します。(その際、一方の鼻孔は指で閉鎖して行ってください。)



- ④噴霧後は薬液を鼻の奥まで広く行き渡らせるために、頭を後方に傾けた状態で数秒間、鼻でゆっくりと呼吸してください。使用後は噴霧器の先端をきれいにふいて、キャップをしめます。

- ・容器を清潔に保つために、使用後は噴霧器の先端部分をきれいにふいてから、必ずキャップをしてください。
- ・小児患者さんの場合は、保護者の監督のもとに使用してください。

医師から指示された用法・用量(1日の噴霧回数、噴霧日数など)を必ず守り、毎日規則正しく使用してください。