


ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」を使用する患者さんへ

このお薬は耳あかを軟らかくして、取りやすくするはたらきがあります。医師・薬剤師の指示のもと正しく使いましょう。

1

お薬を使う前に手を洗いましょう。



2


もし、冷所に保存した場合は、手のひらでお薬の容器を握って体温程度に温め、4~5回振り混ぜてからお使いください。

※このお薬は室温保存です。



3

清潔なティッシュペーパーやガーゼなどで、耳の入り口をやさしくふき取って、きれいにします。



4

点耳する方の耳を上にして横向きに寝ます。そして、お薬を適量(3~5滴程度)、耳の中に滴下します。



5

点耳後は、しばらく(5分程度)そのままの姿勢を保ちます(耳浴)。



6

耳浴後、清潔なティッシュペーパーやガーゼなどを耳にあてて起き上がります。耳の外へあふれ出たお薬はふき取りましょう。

※1日の耳浴回数と耳浴日数は医師の指示に従ってください。



ご注意

- お薬を冷たい状態で耳に入れるとめまいを起すことがありますので注意しましょう。
- 容器の先端が耳に触れてしまった場合は、清潔なティッシュペーパーやガーゼなどで拭いてください。
- 耳浴後に、綿棒を使う場合は、耳の入り口付近をさっと拭き取る程度にしましょう。
- 外耳に傷等がある場合や異常を感じた場合は、使用を控え、医師の指示に従ってください。
- 小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。点眼薬などと間違わないようにしましょう。