

イソソルビド内用液70%「CEO」を服用する患者さんへ

このお薬の色は**無色～淡黄褐色**ですが、
お薬の品質・効果に**影響はありません**。



保管上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 500mLボトルは開封後はしっかり栓を閉めて冷所に保存してください。
- 分包は服用直前まで開封せず、また、服用後の残液は廃棄してください。

次のような方は服用前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください

- 以前にお薬でかゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 頭蓋内血腫、脱水状態、尿閉または腎機能障害、うっ血性心不全がある。
- 妊娠または授乳中である。
- 他に飲んでいるお薬がある。

服用中に気をつけていただくこと

- 決められた量を忘れずに毎日飲んでください。
- 医師の指示なしに、自分の判断でお薬を飲むのを止めないでください。
ただし、何か異常が認められた場合には、お薬の使用を中止し、すぐ医師にご相談ください。

イソソルビド内用液70%「CEO」を服用する患者さんへ

本剤は人工甘味料や香料などで製剤工夫をしていますが、**冷水で2倍程度に薄めることで飲み心地が変わります**ので、必要によってお試しください。



イソソルビドと同量の
冷水



コップに移してもお飲みいただけます。

そのままお飲みになる場合

〈ボトルの薬をお飲みになる方へ〉
指示された量を付属の計量カップで量ってお飲みください。



〈分包の薬をお飲みになる方へ〉
分包の切り口からゆっくりと開封し、こぼさないようにして、中身を残さずお飲みください。
開封時には液の飛び出しにご注意ください。



詳しい服用方法は
こちらの動画をご覧ください。



セオリア 患者の皆さま



ご不明な点、疑問な点は、医師または薬剤師にお尋ねください。