


# オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」を使用する患者さんへ

1



医師の指導に従って、外耳道入口部の分泌物を綿棒で取り除いてください。  
点耳薬は**ほぼ体温程度に温めて**からご使用ください。

2



点耳する方の耳を上にして横向きに寝て、外耳道が垂直になるよう頭の位置を決めてください。容器の先端が直接耳に触れないよう注意して、医師が指示した量の点耳薬を滴下してください。

3



点耳後は**約10分間**、そのままの姿勢で、じっとしててください(耳浴)。  
1日の耳浴回数は医師の指示に従ってください。

4



耳浴後、清潔なガーゼやティッシュペーパー等を耳に当てて起き上がり、耳の外に流れ出た液を拭き取ってください。



## 注意

- 冷たい薬液を耳に入れるとめまいを起すことがありますので、薬液を体温ぐらいまで温めてご使用ください。
- 中耳炎の場合、点耳後、耳たぶを1～2回引き上げて、ゆるめると、薬液を中耳に到達させるのに効果的です。
- 投与期間や1回の投与量については、医師の指示に従ってください。
- 小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。点眼薬などと間違わないようにしましょう。

監修 藤田医科大学 名誉教授 / 医療法人尚徳会 ヨナ八総合病院 前院長 鈴木 賢二 先生  
医療法人尚徳会 ヨナ八丘の上病院 耳鼻咽喉科 部長

CEOIA フェーマ 株式会社  
CEOLIA