

「使用上の注意」改訂のお知らせ

ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
プラナルカスト錠112.5mg「CEO」
プラナルカスト錠225mg「CEO」
プラナルカスト水和物錠

この度、自主的変更により標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしますので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

2017年10月

セオリア ファーマ 株式会社

1. 改訂内容

改訂後(下線部：改訂箇所)	改訂前(取消線部：削除)
<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用(頻度不明)</p> <p>1)～5) 省略</p> <p>6) 横紋筋融解症：横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中ミオグロビン上昇等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用(頻度不明)</p> <p>1)～5) 省略</p> <p>6) 横紋筋融解症：横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中ミオグロビン上昇等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。</p>

2. 改訂理由

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡（平成29年3月14日付）に基づき、「急性腎不全」の用語を「急性腎障害」に記載整備いたしました。

「使用上の注意」等の全文は、改訂添付文書をご覧ください。

お問い合わせ先



セオリアファーマ株式会社 メディカルインフォメーション室
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号

CEOLIA TEL 0120-72-1136 (フリーコール 9:00～17:00/土・日・祭日は除く)