

# 「使用上の注意」改訂のお知らせ

処方箋医薬品

セフェム系抗生物質製剤  
**ベストロン<sup>®</sup>耳鼻科用1%**  
BESTRON<sup>®</sup> FOR EAR AND NOSE 1%  
局所外用セフェメノキシム塩酸塩

この度、自主的変更により標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしますので、お知らせ申し上げます。  
本剤のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

2018年3月

製造販売元 **千寿製薬株式会社**  
発 売 元 **セオリアファーマ株式会社**

## 改訂内容

改 訂 後 (下線部：改訂箇所)	改 訂 前 (取消線部：削除)
<p>【使用上の注意】 鼻科用</p> <p>3. 副作用 (1) 重大な副作用</p> <p>1) ショック、<u>アナフィラキシー</u>（頻度不明）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、蕁麻疹、チアノーゼ、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>	<p>【使用上の注意】 鼻科用</p> <p>3. 副作用 (1) 重大な副作用</p> <p>1) ショック、<u>アナフィラキシー様症状</u>（頻度不明）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、蕁麻疹、チアノーゼ、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>
<p>【使用上の注意】 耳科用</p> <p>3. 副作用 (1) 重大な副作用</p> <p>ショック (0.1%未満)、<u>アナフィラキシー</u>（頻度不明）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、蕁麻疹、チアノーゼ、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>	<p>【使用上の注意】 耳科用</p> <p>3. 副作用 (1) 重大な副作用</p> <p>ショック (0.1%未満)、<u>アナフィラキシー様症状</u>（頻度不明）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、蕁麻疹、チアノーゼ、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>

「使用上の注意」等の全文は、改訂添付文書をご覧ください。

お問い合わせ先



セオリアファーマ株式会社 メディカルインフォメーション室  
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号

CEOLIA TEL 0120-72-1136 (フリーコール 9:00~17:00/土・日・祭日は除く)